

済生会横浜市南部病院 抗がん剤レジメン集

2021/3/31 更新

非ホジキンリンパ腫

レジメン名	投与間隔(日)	クール数	薬剤名(一般名)	用量	投与日(日目)
CHOP	21	8	ドキソルピシン	50	mg/m ²
			ビンクリスチン	1.4(最大2)	mg/m ²
			シクロホスファミド	750	mg/m ²
			プレドニゾン	100	mg/body
ESHAP	21	4	メチルプレドニゾン	500	mg/body
			シスプラチン	25	mg/m ²
			エトポシド	40	mg/m ²
			シタラビン	2000	mg/m ²
DHAP	21	∞	デキサメタゾン	40	mg/body
			シスプラチン	100	mg/m ²
			シタラビン	4000	mg/m ²
DeVIC	21	4	デキサメタゾン	40	mg/body
			カルボプラチン	300	mg/m ²
			エトポシド	100	mg/m ²
			イホスファミド	1500	mg/m ²
Bendamustine(再発・難治)	21	6	ベンダムスチン	120	mg/m ²
Hyper-CVAD	21	4	デキサメタゾン	40	mg/body
			シクロホスファミド	600	mg/m ²
			ビンクリスチン	1.4	mg/m ²
			ドキソルピシン	16.6	mg/m ²
MA	21	4	メトレキサート	1000	mg/m ²
			シタラビン	6000	mg/m ²
髄注(MTX+Dex)	—	—	メトレキサート	15	mg/body
髄注(MTX+PSL)	—	—	デキサメタゾン	4	—
			メトレキサート	15	mg/body
髄注(MTX+Ara-C+Dex)	—	—	プレドニゾン	10	—
			メトレキサート	15	mg/body
			シタラビン	40	—
			デキサメタゾン	4	—
GDP	21	6	ゲムシタピン	1000	mg/m ²
			シスプラチン	75	mg/m ²
			デキサメタゾン	40	mg/body
GDC	21	4	ゲムシタピン	1000	mg/m ²
			カルボプラチン	5	AUC
			デキサメタゾン	40	mg/body
HD-MTX	14	∞	メトレキサート	3000	mg/m ²
DRC(リツキシマブ【BS】)	21	6	デキサメタゾン	20	mg/body
			リツキシマブ	375	mg/m ²
			シクロホスファミド	200	mg/m ² /日
CHASE	21	4	デキサメタゾン	40	mg/body
			シクロホスファミド	1200	mg/m ²
			シタラビン	2000	mg/m ²
			エトポシド	100	mg/m ²
THP-COP	21	8	ピラルピシン	50	mg/m ²
			ビンクリスチン	1.4	mg/m ²
			シクロホスファミド	750	mg/m ²
			プレドニゾン	100	mg/body
RB	28	6	ベンダムスチン	90	mg/m ²
			リツキシマブ	375	mg/m ²
Brentuximab Vedotin	21	16	ブレンツキシマブベドチン	1.8	mg/kg
Mogamulizumab	7	8	モガムリズマブ	1	mg/kg
FCR(リツキシマブ【BS】)	28	6	リツキシマブ	375	mg/m ²
			フルダラビン	25	mg/m ²
			シクロホスファミド	250	mg/m ²

済生会横浜市南部病院 抗がん剤レジメン集

2021/3/31 更新

Obinutuzumab	21	8	オビヌツズマブ	1000	mg/body	1,8,15
Obinutuzumab 維持療法	56(2か月)	2年間	オビヌツズマブ	1000	mg/body	1
GB	28	6	オビヌツズマブ	1000	mg/body	1,8,15
Rituximab	7	8	ベンダムスチン	90	mg/m ²	1,2(1クール目のみ2,3)
Rituximab(維持療法)	56	12	リツキシマブ	375	mg/m ²	1
ICE	21	∞	エトボシド	100	mg/m ²	1,2,3
			カルボプラチン	5	AUC	2
			イホスファミド	5000	mg/m ²	2
DA-EPOCH	21	8	エトボシド	50~86.4	mg/m ²	1,2,3,4
			ドキシソルピシン	10~17.2	mg/m ²	1,2,3,4
			ピンクリスチン	0.4	mg/m ²	1,2,3,4
			シクロホスファミド	750~1296	mg/m ²	5
			プレドニゾロン	60	mg/m ² /日	1,2,3,4,5
Romidepsin単剤	28	∞	ロミデプシン	14	mg/kg	1,8,15
RB[120mg/m ²]	28	6	ベンダムスチン	90	mg/m ²	1,2
			リツキシマブ	375	mg/m ²	1
R2	28	12	リツキシマブ	375	mg/m ²	(1クール目)1,8,15,22 (2~5クール目)1
			レブラミド	20	mg/日	(1~12クール目)1~21
Brentuximab Vedtin+CHP	21	6~8	ドキシソルピシン	50	mg/m ²	1
			シクロホスファミド	750	mg/m ²	1
			ブレンツキシマブベドチン	1.8	mg/kg	1
			プレドニゾロン	100	mg/body	1~5
			リツキシマブ	375	mg/m ²	1
Pola+BR	21	6	ベンダムスチン	90	mg/m ²	(1クール目)2,3 (2~6クール目)1,2
			ポラツズマブベドチン	1.8	mg/kg	(1クール目)2 (2~6クール目)1
Biweekly CHOP	14	8	ドキシソルピシン	50	mg/m ²	1
			ピンクリスチン	1.4(最大2)	mg/m ²	1
			シクロホスファミド	750	mg/m ²	1
			プレドニゾロン	100	mg/body	1,2,3,4,5
			リツキシマブ	375	mg/m ²	1
Pola-R-GHP	21	8	シクロホスファミド	750	mg/m ²	1
			ドキシソルピシン	50	mg/m ²	1
			ポラツズマブベドチン	1.8	mg/kg	2
			プレドニゾロン	100	mg/body	1~5
VR-CAP	21	6~8	ボルテゾミブ	1.3	mg/m ²	1,4,8,11
			リツキシマブ	375	mg/m ²	1
			シクロホスファミド	750	mg/m ²	1
			ドキシソルピシン	50	mg/m ²	1
			プレドニゾロン	100	mg/body	1

ホジキンリンパ腫

レジメン名	投与間隔(日)	クール数	薬剤名(一般名)	用量	投与日(日目)
ABVD	28	8	ピンラスチン	6	mg/m ²
			ドキシソルピシン	25	mg/m ²
			プレオマイシン	10	mg/m ²
			ダカルバジン	375	mg/m ²
ESHAP	21	4	メチルプレドニゾロン	500	mg/body
			シスプラチン	25	mg/m ²
			エトボシド	40	mg/m ²
			シタラビン	2000	mg/m ²
Brentuximab Vedotin	21	16	ブレンツキシマブベドチン	1.8	mg/kg
nivolumab	14	∞	ニボルマブ	240	mg/body

A+AVD	28	6	ビンプラスチン	6	mg/㎡	1,15
			ドキシソルピシン	25	mg/㎡	1,15
			ダカルバジン	375	mg/㎡	1,15
			プレニツキシマブベドテン	1.8	mg/kg	1,15

多発性骨髄腫

レジメン名	投与間隔(日)	クール数	薬剤名(一般名)	用量	投与日(日目)				
VD 週2回(皮下注射)	21	∞	ボルテソミブ	1.3	mg/㎡	1,4,8,11			
			デキサメタゾン	20	mg/body/日	1,2,4,5,8,9,11,12			
VD 週1回(皮下注射)	35	∞	ボルテソミブ	1.3	mg/㎡	1,8,15,22			
			デキサメタゾン	20	mg/body/日	1,2,8,9,15,16,22,23			
VMP(皮下注射)	35	9	ボルテソミブ	1.3	mg/㎡	1,8,15,22			
			メルファラン	9	mg/㎡/日	1,2,3,4			
			ブレドニソロン	60	mg/㎡/日	1,2,3,4			
			デキサメタゾン	20	mg/body/日	8,15,22			
VTD 週2回(皮下注射)	21	4	ボルテソミブ	1	mg/㎡	1,4,8,11			
			デキサメタゾン	20	mg/body/日	1,2,4,5,8,9,11,12			
			サリドマイド	100	mg/body/日	1~21			
VTD 週1回(皮下注射)	35	∞	ボルテソミブ	1.3	mg/㎡	1,8,15,22			
			デキサメタゾン	20	mg/body/日	1,2,8,9,15,16,22,23			
			サリドマイド	100	mg/body/日	1~35			
VGD(皮下注射)	35	∞	ボルテソミブ	1.3	mg/㎡	1,8,15,22			
			デキサメタゾン	20	mg/body/日	1,2,8,9,15,16,22,23			
			シクロホスファミド	300	mg/㎡/日	1,8,15,22			
VRD週1回(皮下注射)	28	∞	ボルテソミブ	1.3	mg/㎡	1,8,15			
			デキサメタゾン	40	mg/body/日	1,8,15			
			レナリドミド	10	mg/body/日	1~21			
VFD 週1回(皮下注射)	21	∞	ボルテソミブ	1.3	mg/㎡	1,8			
			デキサメタゾン	20	mg/body/日	1,2,8,9			
			パノピノスタット	20	mg/body/日	1,3,5,8,10,12			
VFD 週2回(皮下注射)	21	∞	ボルテソミブ	1.3	mg/㎡	1,4,8,11			
			デキサメタゾン	20	mg/body/日	1,2,4,5,8,9,11,12			
			パノピノスタット	20	mg/body/日	1,3,5,8,10,12			
KRD	28	18	カルフィルゾミブ	(1クール1,2日目)20 (1クール8日目で降)27	mg/㎡	(1~12クール)1,2,8,9,15,16 (13~18クール)1,2,15,16			
			デキサメタゾン	40	mg/body/日	1,8,15,22			
			レナリドミド	25	mg/body/日	1~21			
VRD 週2回(皮下注射)	21	∞	ボルテソミブ	1.3	mg/㎡	1,4,8,11			
			デキサメタゾン	20	mg/body/日	1,2,4,5,8,9,11,12			
			レナリドミド	25	mg/body/日	1~14			
ERD	28	∞	エロツズマブ	10	mg/kg	1,8,15,22			
			デキサメタゾン(注射)	8	mg/body/日	(1~2クール目)1,8,15,22 (3クール目~)1,15			
			デキサメタゾン(内服)	(1~2クール目)28 (3クール目以降) 28(1,15日目) 40(8,22日目)	mg/body/日	1,8,15,22			
レナリドミド	25	mg/body/日	レナリドミド	25	mg/body/日	1~21			
			KD 週2回	28	∞	カルフィルゾミブ	(1クール1,2日目)20 (1クール8日目で降)56	mg/㎡	1,2,8,9,15,16
						デキサメタゾン	20	mg/body/日	1,2,8,9,15,16,22,23
VPD 週1回(皮下注射)	28	∞	ボルテソミブ	1.3	mg/㎡	1,8,15,22			
			デキサメタゾン	40	mg/body/日	1,8,15,22			
			ボマリドミド	4	mg/body/日	1~21			

済生会横浜市南部病院 抗がん剤レジメン集

DLd	28	∞	ダラツムマブ	16	mg/kg	(1~2クール)1,8,15,22 (3~6クール)1,15 (7クール目以降)1
			デキサメタゾン	20	mg/body/日	1,8,15,22
			レナリドミド	25	mg/body/日	1~21
DBd	(1~8クール)21 (9クール以降)28	∞	ダラツムマブ	16	mg/kg	(1~3クール)1,8,15 (4クール以降)1
			デキサメタゾン	20	mg/body/日	(1~8クール)1,2,4,5,8,9,11,12
			ボルテゾミブ	1.3	mg/m ²	(1~8クール)1,4,8,11
VRD lite(皮下注射)	(1~9クール)35 (10クール以降)28	∞	ボルテゾミブ	1.3	mg/m ²	(1~9クール)1,8,15,22 (10クール以降)1,15
			デキサメタゾン	20	mg/body/日	(1~9クール) 【75歳以下】1,2,8,9,15,16,22,23 【76歳以上】1,8,15,22
			レナリドミド	15	mg/body/日	1~21
KD 週1回	28	∞	カルフィルゾミブ	(1クール1日目)20 (1クール8日目以降)70	mg/m ²	1,8,15
			デキサメタゾン	40	mg/body/日	1,8,15,22
DMPB(皮下注)	(1~9クール)42 (10クール以降)28	∞	ダラツムマブ	16	mg/kg	(1クール)1,8,15,22,29,36 (2~9クール)1,22 (10クール)1
			ボルテゾミブ	1.3	mg/m ²	(1クール)1,4,8,11,22,25,29,32 (2~9クール)1,8,22,29
			デキサメタゾン	20	mg/body/日	(1クール)1,8,15,22,29,36 (2~9クール)1,22 (10クール)1
			メルファラン	9	mg/m ² /日	(1~9クール)1,2,3,4
			ブレドニゾロン	60	mg/m ² /日	(1~9クール)2,3,4
IsaPd	28	∞	サークリサ	10	mg/kg	(1クール)1,8,15,22 (2クール目以降)1,15
			レナリドミド	【75歳未満】40 【75歳以上】20	mg/body	1,8,15,22
			ボマリドミド	4	mg/body	1~21
DMPB(皮下注、ダラキューロ)	(1~9クール)42 (10クール以降)28	∞	ダラツムマブ	1800	mg/body	(1クール)1,8,15,22,29,36 (2~9クール)1,22 (10クール)1
			ボルテゾミブ	1.3	mg/m ²	(1クール)1,4,8,11,22,25,29,32 (2~9クール)1,8,22,29
			デキサメタゾン	20	mg/body/日	(1クール)1,8,15,22,29,36 (2~9クール)1,22 (10クール)1
			メルファラン	9	mg/m ² /日	(1~9クール)1,2,3,4
			ブレドニゾロン	60	mg/m ² /日	(1~9クール)2,3,4
DBd(皮下注、ダラキューロ)	(1~8クール)21 (9クール以降)28	∞	ダラツムマブ	1800	mg/body	(1~3クール)1,8,15 (4クール以降)1
			デキサメタゾン	20	mg/body/日	(1~8クール)1,2,4,5,8,9,11,12
			ボルテゾミブ	1.3	mg/m ²	(1~8クール)1,4,8,11
DLd(皮下注、ダラキューロ)	28	∞	ダラツムマブ	1800	mg/body	(1~2クール)1,8,15,22 (3~6クール)1,15 (7クール目以降)1
			デキサメタゾン	【初発】40 【再発難治】20	mg/body/日	1,2,8,9,15,16,22,23
			レナリドミド	25	mg/body/日	1,8,15,22
			ボマリドミド	4	mg/body	1~21
			エロツズマブ	【1,2クール目】10 【3クール目以降】20	mg/kg	1,8,15,22 1
			デキサメタゾン(注射)	6.6	mg/body/日	(1~2クール目)1,8,15,22 (3クール目~)1

EPd	28	∞	デキサメタゾン(内服)	【75歳未満】(1~2クール目)28 【75歳以上】(1~2クール目)8 (3クール目以降) 【75歳未満】28 (1日目) 40 (8.15.22日目) 【75歳以上】8 (1日目) 20 (8.15.22日目)	mg/body/日	1.8.15.22
DKd(ダラキューロ)	28	∞	ダラツムマブ	1800	mg/body	(1~2クール)1,8,15,22 (3~6クール)1,15 (7クール目以降)1
			カルフィルゾミブ	(1クール1,2日目)20 (1クール8日目以降)56	mg/m ²	1,2,8,9,15,16
			デキサメタゾン	(1,2,8,9,15,16日目)20 (22日目)40	mg/body/日 mg/body/日	1,2,8,9,15,16 22
DPd	28	∞	ダラツムマブ	16	mg/kg	(1~2クール)1,8,15,22 (3~6クール)1,15 (7クール目以降)1
			ポマリドミド	4	mg/body	1~21
			デキサメタゾン	20 40	mg/body/日 mg/body/日	(1~2クール)1,2,8,9,15,16,22,23 (3~6クール)1,2,15,16 (7クール目以降)1,2 (3~6クール)8,22 (7クール目以降)8,15,22
DPd(ダラキューロ)	28	∞	ダラツムマブ	1800	mg/body	(1~2クール)1,8,15,22 (3~6クール)1,15 (7クール目以降)1
			ポマリドミド	4	mg/body	1~21
			デキサメタゾン	20 40	mg/body/日 mg/body/日	(1~2クール)1,2,8,9,15,16,22,23 (3~6クール)1,2,15,16 (7クール目以降)1,2 (3~6クール)8,22 (7クール目以降)8,15,22
Isad	28	∞	サークリサ	20	mg/kg	(1クール)1,8,15,22 (2クール目以降)1,15
			レナリドミド	【75歳未満】40 【75歳以上】20	mg/body	1,8,15,22

急性骨髄性白血病

レジメン名	投与間隔(日)	クール数	薬剤名(一般名)	用量	投与日(日目)
GAG(Ara-C 24時間持続)	14	—	アクリルピシシン	14	mg/m ² 1,2,3,4
寛解導入療法(DNR+Ara-C)	7	—	シタラピン	20	mg/m ² 1~14
			ダウノルピシシン	50	mg/m ² 1,2,3,4,5
MIT	21	∞	シタラピン	100	mg/m ² 1~7
GO	14	2	ミトキサントロン	7	mg/m ² 1,2,3,4,5
大量Ara-C療法	28	∞	ゲムツズマブオゾガマイシシン	9	mg/m ² 1
地固め療法①(MIT+Ara-C)	—	1	シタラピン	4000	mg/m ² 1,2,3,4,5
			ミトキサントロン	7	mg/m ² 1,2,3
地固め療法②(DNR+Ara-C)	—	1	シタラピン	200	mg/m ² 1,2,3,4,5
			ダウノルピシシン	50	mg/m ² 1,2,3
地固め療法③(ACR+Ara-C)	—	1	シタラピン	200	mg/m ² 1,2,3,4,5
			アクリルピシシン	20	mg/m ² 1,2,3,4,5
			シタラピン	200	mg/m ² 1,2,3,4,5
			エトポシド	100	mg/m ² 1,2,3,4,5

地固め療法②(A tripleV)	—	1	シタラビン	200	mg/㎡	1,2,3,4,5
			ピンクリスチン	0.8(最大2)	mg/㎡	8
			ビンデシン	2	mg/㎡	10
Ara-C単独療法	21	∞	シタラビン	1.6	mg/kg	1~21
Low dose Ara-C(24時間持続)	—	∞	シタラビン	20	mg/㎡	1~14
Low dose Ara-C(皮下注射)	—	∞	シタラビン	20	mg/㎡	1~14
ETP単剤療法	26	∞	エトポシド	100	mg/㎡	1,2,3,4,5
髄注(MTX+Ara-C+PSL)	—	∞	メソトレキサート	15		
			シタラビン	40	mg/body	1
			プレドニゾン	10		
miniMEC	—	1	ミトキサントロン	8	mg/㎡	1.2.3
			エトポシド	100	mg/㎡	1.2.3.4.5
			シタラビン	100	mg/㎡	1~7
			アザシチジン	75	mg/㎡	1~7
Venetoclax+Azacitidine(点滴静注)	28	∞	ベネトクラクス	100		(1クール目)1
				200	mg/body	(1クール目)2
				400		(1クール目)3~28
						(2クール目以降)1~28
Azacitidine(点滴静注)	28	∞	アザシチジン	75	mg/㎡	1~7
Azacitidine(皮下注)	28	∞	アザシチジン	75	mg/㎡	1~7
			シタラビン	20	mg/㎡	1~10
				100		(1クール目)1
				200	mg/body	(1クール目)2
			ベネトクラクス	400		(1クール目)3
				600		(1クール目)4~28
						(2クール目以降)1~28
			アザシチジン	75	mg/㎡	1~7
				100		(1クール目)1
			ベネトクラクス	200	mg/body	(1クール目)2
				400		(1クール目)3~28
				400		(2クール目以降)1~28
JALSG GML219 寛解導入療法	8	1(非寛解の場合は2)	ダウノルビシン	45	mg/㎡	1.2.3
			シタラビン	100	mg/㎡	1~7
JALSG GML219 地固め療法①	6	1	ミトキサントロン	7	mg/㎡	1.2.3
			シタラビン	200	mg/㎡	1~5
JALSG GML219 地固め療法②	6	1	ダウノルビシン	40	mg/㎡	1.2
			シタラビン	200	mg/㎡	1~5
JALSG GML219 地固め療法③	6	1	アクリルピシチン	16	mg/㎡	1~5
			シタラビン	200	mg/㎡	1~5

急性前骨髄性白血病

レジメン名	投与間隔(日)	クール数	薬剤名(一般名)	用量	投与日(日目)
JALSG APL212 寛解導入	—	1	イダルビシン	12	mg/㎡
			シタラビン	100	mg/㎡
ATO(JALSG寛解導入療法)	—	1	三酸化二ヒ素	0.15	mg/kg
ATO(JALSG寛解後療法)	7	5	三酸化二ヒ素	0.15	mg/kg
					最大60
髄注(MTX+Ara-C+PSL)	—	∞	メソトレキサート	15	
			シタラビン	40	mg/body
			プレドニゾン	10	
					1

急性リンパ性白血病

レジメン名	投与間隔(日)	クール数	薬剤名(一般名)	用量	投与日(日目)
-------	---------	------	----------	----	---------

済生会横浜市南部病院 抗がん剤レジメン集

MIT	21	∞	ミトキサントロン	7	mg/㎡	1,2,3,4,5
VCR	7	∞	ビンクリスチン	0.05	mg/kg	1
JALSG ALL202-O 寛解導入(≥60歳)	—	1	シクロホスファミド	800	mg/㎡	1
			ダウノルビシン	30	mg/㎡	1,2,3
			ビンクリスチン	1.3(最大2)	mg/㎡	1,8,15,22
			ブレドニゾロン	60	mg/㎡	1~7
			L-アスパラギナーゼ	3000	U/㎡	9,11,13,16,18,20
			デキサメタゾン	40	mg/body	1,2,3,4,11,12,13,14
Hyper-CVAD	21	4	シクロホスファミド	600	mg/㎡	1,2,3
			ビンクリスチン	1.4(最大2)	mg/㎡	4,11
			ドキシソルピシン	16.6	mg/㎡	4,5,6
			メトレキサート	1000	mg/㎡	1
MA	21	4	シタラビン	6000	mg/㎡	2,3
			シクロホスファミド	1200	mg/㎡	1
JALSG ALL202-O 寛解導入(25歳以上60歳未満)	—	1	ダウノルビシン	60	mg/㎡	1,2,3
			ビンクリスチン	1.3(最大2)	mg/㎡	1,8,15,22
			ブレドニゾロン	60	mg/㎡/日	1~21
			L-アスパラギナーゼ	3000	U/㎡	9,11,13,16,18,20
			ビンクリスチン	1.3(最大2)	mg/㎡	1
			ブレドニゾロン	60	mg/㎡/日	1,2,3,4,5
JALSG ALL202-O 維持	28	寛解導入開始日~2年間	メトレキサート	20	mg/㎡/日	1,8,15,22
			メルカプトプリン	60	mg/㎡/日	1~28
			シクロホスファミド	1200	mg/㎡	1
			ダウノルビシン	60	mg/㎡	1,2,3
			ビンクリスチン	1.3(最大2)	mg/㎡	1,8,15,22
JALSG Ph(+)-ALL208寛解導入	—	1	ブレドニゾロン	60	mg/㎡/日	1~21(漸減~28まで)
			イマチニブ	600	mg/body/日	4~38
			メトレキサート	15		
			シタラビン	40	mg/body	29
			デキサメタゾン	4		
			エトポシド	100	mg/㎡	1,2,3,4,5
			シタラビン	4000	mg/㎡	1,2,3
JALSG ALL202-O 地固め C1	—	2	エトポシド	100	mg/㎡	1,2,3
			デキサメタゾン	40	mg/body	1,2,3
			メトレキサート	15		
			デキサメタゾン	4	mg/body	1
			ビンクリスチン	1.3(最大2)	mg/㎡	1,15
			メトレキサート	3000	mg/㎡	1,15
JALSG ALL202-O 地固め C2	—	2	メルカプトプリン	25	mg/㎡/日	1~21
			メトレキサート	15		
			デキサメタゾン	4	mg/body	1,15
			ビンクリスチン	1.3(最大2)	mg/㎡	1,8,15
			ドキシソルピシン	30	mg/㎡	1,8,15
JALSG ALL202-O 地固め C3	—	1	シクロホスファミド	1000	mg/㎡	29
			シタラビン	75	mg/㎡	29,30,31,32,33,36,37,38,39,40
			デキサメタゾン	10	mg/㎡/日	1~8,15~22
			メルカプトプリン	60	mg/㎡/日	29~42
			メトレキサート	15		
			シタラビン	40	mg/body	1,29
			デキサメタゾン	4		
			ビンクリスチン	2	mg/body	1
			ブレドニゾロン	2	mg/kg/日	1~7
			メルカプトプリン	2	mg/kg/日	1~7
VPM	7	∞	ビンクリスチン	2	mg/body	1
Blinatumomab	(1~5クール)42	9	プリナツモマブ	(1クール1~7日目)9	μg/㎡	1~28
	(6~9クール)84			(1クール8日目以降)28		
Inotuzumab Ozogamicin	(1クール)21or28	6	イノツズマブ オゾガマイシン	(1クール1日目)0.8	mg/㎡	1,8,15
	(2~6クール)28			(1クール8日目以降)0.5		

慢性骨髄性白血病

レジメン名	投与間隔(日)	クール数	薬剤名(一般名)	用量	投与日(日目)	
VPM	7	∞	ピンクリスチン	2	mg/kg	1
			プレドニゾン	2	mg/kg	1
			メルカプトプリン	2	mg/kg	1

慢性リンパ性白血病

レジメン名	投与間隔(日)	クール数	薬剤名(一般名)	用量	投与日(日目)	
CHOP	21	8	ドキシソルピシン	50	mg/m ²	1
			ピンクリスチン	1.4(最大2)	mg/m ²	1
			シクロホスファミド	750	mg/m ²	1
			プレドニゾン	100	mg/body	1,2,3,4,5
cladribine	—	—	クラドリビン	0.09	mg/kg	1~7
FC	28	6	フルダラビン	25	mg/m ²	1,2,3
			シクロホスファミド	250	mg/m ²	1,2,3
Bendamustine	28	∞	ベンダムスチン	100	mg/m ²	1,2

骨髄異形成症候群

レジメン名	投与間隔(日)	クール数	薬剤名(一般名)	用量	投与日(日目)	
Azacitidine(点滴静注)	28	∞	アザシチジン	75	mg/m ²	1~7
Azacitidine(皮下注)	28	∞	アザシチジン	75	mg/m ²	1~7
CAG(Ara-C24時間持続)	14	—	アクリルピシチン	14	mg/m ²	1,2,3,4
			シタラビン	20	mg/m ²	1~14
LowdoseAra-C(24時間持続)	—	∞	シタラビン	20	mg/m ²	1~14
LowdoseAra-C(皮下注)	—	∞	シタラビン	20	mg/m ²	1~14

成人T細胞性白血病

レジメン名	投与間隔(日)	クール数	薬剤名(一般名)	用量	投与日(日目)	
mLSG15	28	6	ドキシソルピシン	(1日目)40 (8日目)30	mg/m ²	1,8
			ピンクリスチン	1(最大2)	mg/m ²	1
			シクロホスファミド	350	mg/m ²	1
			ラニムスチン	60	mg/m ²	8
			ビンデシン	2.4	mg/m ²	15
			カルボプラチン	250	mg/m ²	15
			エトポシド	100	mg/m ²	15,16,17
			プレドニゾン	40	mg/m ²	1,8,15,16,17
			ドキシソルピシン	50	mg/m ²	1
Biweekly CHOP	14	8	ピンクリスチン	1.4(最大2)	mg/m ²	1
			シクロホスファミド	750	mg/m ²	1
			プレドニゾン	100	mg/body	1,2,3,4,5
Mogamulizumab	7	8	モガムリズマブ	1	mg/kg	1
Mogamulizumab(併用時)	14	8	モガムリズマブ	1	mg/kg	1

造血幹細胞移植

レジメン名	投与間隔(日)	クール数	薬剤名(一般名)	用量	投与日(日目)	
Harvest-CPA	—	—	シクロホスファミド	2000	mg/m ²	移植前2日間
L-PAM大量	—	—	メルファラン	100	mg/m ²	移植前日、前々日

Harvest-ETP	—	—	エトポシド	500	mg/m ²	移植前3日間
			ラニムスチン	300	mg/m ²	移植7日前
MEAM	—	—	シタラビン	4000	mg/m ²	移植3,4日前
			エトポシド	200	mg/m ²	移植3,4,5,6日前
			メルファラン	140	mg/m ²	移植2日前